

Zur Pathologie der chronischen Gonorrhoe mit
besonderer Berücksichtigung der Urethritis posterior.

Inaugural-Dissertation

welche nebst den beigefügten Thesen

mit Genehmigung der

medizinischen Fakultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin und Chirurgie

Donnerstag, den 24. Juli 1890, Mittags 12 Uhr

in der kleinen Aula

öffentlich vertheidigen wird

Robert Nischkowsky,

prakt. Arzt.

Opponenten:

Dr. med. **Kühnast**, praktischer Arzt.

Dr. med. **Wieland**, praktischer Arzt.

Breslau,

Druck von Robert Nischkowsky.

1890.

Der Druck genehmigt auf Antrag des Referenten
Herrn Prof. Dr. Fischer.

Pathologie der chronischen Gonorrhoe mit besonderer Berücksichtigung
der Urethritis posterior.

Während die Kenntniss der akuten Gonorrhoe bis zu den ältesten Zeiten zurückreicht, wurde die chronische Form dieser Krankheit bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts allzuwenig gewürdigt. Gewöhnlich wurde sie als eine Schwäche der Harnröhrenschleimhaut, hervorgerufen durch die vorhergegangene akute Erkrankung angesehen, obwohl schon in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts die Verengerungen der Harnröhre und ihre Behandlung mittels Dilatation wohl bekannt waren. Erst der neueren Zeit war es vorbehalten, die eminente Bedeutung der chronischen Gonorrhoe zu erkennen — als eines Leidens, welches sowohl für die Weiterverbreitung des Trippers in allererster Linie in Betracht kommt, als auch für das erkrankte Individuum selbst nach den verschiedensten Richtungen hin eine schädliche Wirkung auszuüben vermag. Wenn auch zugegeben werden muss, dass gegenüber der kolossalen Zahl akuter Gonorrhöen chronische Fälle mit wirklich schweren Folgen immerhin zu den Seltenheiten gehören, so kann man doch in keinem einzelnen Falle die Prognose günstig stellen, weil in jedem sich die gefährlichsten Consequenzen früher oder später einstellen können. Zu diesen gehören in erster Linie die Strikturen mit allen ihren Folgen (Blasenkatarrh, con- und excentrische Blasenhypertrophie, Nierenerkrankungen, Harninfiltration u. s. w.), ferner Erkrankungen der benachbarten Organe: Epididymitis, Prostatitis u. s. w., endlich eine ganze Zahl nervöser und selbst die geistige Gesundheit des Individuums untergrabender Störungen.

Das zweite und sicherlich noch wesentlichere Moment, welches die chronische Gonorrhoe geradezu zu einem für die sociale Hygiene ausserordentlich wichtigen Gegenstand macht, ist die Frage nach ihrer Infektiosität. Während man früher die Ansteckungsfähigkeit einer chronischen Gonorrhoe nach dem Vorhandensein von eitrigem Sekret beurtheilte und dieselbe mit Bestimmtheit leugnen zu

können glaubte, sobald der Ausfluss schleimig geworden war, hat zum ersten Mal Nöggerath¹⁾ die Behauptung aufgestellt, dass der chronische Tripper des Mannes eine ganz unbegrenzte Zeit lang infektiös bleiben könne und in der Mehrzahl der Fälle auch bleibe, und dass eine sehr grosse Zahl von gynäkologischen Leiden auf der Ansteckung von solchen latenten chronischen Gonorrhöen aus beruhe. Es ist Nöggerath's unbestritten Verdienst, zum ersten Male auf die Bedeutung des Trippers für die Ehe hingewiesen zu haben; aber er und alle Gynäkologen, welche auf seinen Bahnen gewandelt sind, in erster Linie Sänger²⁾, haben wohl zweifellos über das Ziel hinausgeschossen. Es geht nicht an, jede Frauenerkrankung auf eine Gonorrhoe zurückzuführen, welche sich in der Anamnese des Mannes auffinden lässt. Die Frage nach der Infektiosität der chronischen Gonorrhoe lässt sich in der That nur von Fall zu Fall entscheiden, wie Neisser³⁾ das bereits im Jahre 1888 nachgewiesen; sie lässt sich entscheiden nur durch die sorgfältigste mikroskopische Untersuchung, die nicht einmal, sondern wiederholt vorgenommen werden muss, wenn ihr negatives Resultat massgebend sein soll.

Neisser untersuchte 143 Fälle von chronischer Urethritidensekretion; deren Alter von 2 Monaten bis 8 Jahren schwankte. Von diesen 143 zeigte das Sekret von 80 Gonokokken, von 63 keine bei mehrfacher, von 31 keine bei einmaliger Untersuchung. Es ergaben sich Gonokokken bei Gonorrhoe von mehr als 60 jährigem Alter in 18 Fällen, keine in 20 Fällen, von denen indessen 11 nur einmal untersucht werden konnten. Bei über zwei Jahrzehnten alten Fällen fanden sich Gonokokken in 20 Fällen, keine in 23 (wovon 9 nur einmal untersucht waren).

Die Untersuchung ergab einerseits, dass chronische Urethritidensekretionen existiren, bei welchen sich Gonokokken nicht nachweisen lassen, andererseits aber noch das interessante Resultat, dass auch bei gonokokkenhaltiger chronischer Urethritis die Gonokokken weder stets vorhanden sind noch gesetzmässig im Sekret auftreten.

1) Die latente Gonorrhoe beim weibl. Geschl. Bonn 1872.

2) Weibliche Gonorrhoe. Vortrag Leipzig 1889.

3) Ansteckungsfähigkeit der chron. Gonorrhoe. Vortrag Strassburg 1888.

Die Thatsache also, dass eine gonorrhoeische Infektion in der Ehe erfolgen kann, ohne dass der inficirende Theil für ihn manifeste Symptome aufzuweisen braucht, lässt sich gar nicht leugnen. Die Folgen einer derartigen Infektion können zweifellos sehr schwerwiegende sein: Endo-, Peri-, Parametritis, Salpingitis, Sterilität werden auf die Gonorrhoe zurückgeführt; wie häufig diese Folgen der Gonorrhoe sind und wie weit sie in einem mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit ihr stehen, werden weitere Untersuchungen lehren müssen. Wenn nun aus den angeführten Gründen die chronische Gonorrhoe eine sehr schwerwiegende Bedeutung besitzt, so erscheint es wohl der Mühe werth, sie auf Grund der in der neuesten Zeit gemachten Erfahrungen einer eingehenden Betrachtung besonders mit Rücksicht auf eine Erscheinungsform zu unterziehen, auf welche auch wesentlich erst im letzten Jahrzehnt sich die Aufmerksamkeit gelenkt hat, nämlich mit Rücksicht auf die Urethritis posterior.

Es kann und soll nicht meine Aufgabe sein, hier das gesammte klinische Bild der chronischen Gonorrhoe zu entwerfen; ich beabsichtige mich vielmehr darauf zu beschränken, speciell die Bedeutung der Urethritis posterior für die chronische Gonorrhoe ausführlicher zu erörtern.

Eine Definition des Begriffs „chronische Gonorrhoe“ zu geben, ist kaum nöthig, auch kaum möglich; nur das eine möchte ich betonen, dass man den Begriff „chronisch“ in zweifacher Weise auffassen kann: einmal zeitlich — dann wäre jeder länger, als eine bestimmte Zeit anhaltende Tripper ein chronischer, — oder mehr klinisch — dann versteht man unter chronisch das Fehlen akuter, stürmischer Entzündungserscheinungen, beim Tripper speciell das Fehlen reichlichen, eitrigen Sekrets, stärkerer subjektiver Beschwerden u. s. w. Es giebt aber auch Gonorrhöen, die nicht eigentlich rein chronisch nach ihrem klinischen Bilde, sondern bald chronisch, bald scheinbar akut sind — diese stüssten noch eine besondere Gruppe „chronischer Tripper mit akuten Exacerbationen“ ausmachen. Es bedarf auch wohl kaum erst der Erwähnung, dass es beim Tripper, wie bei jedem anderen Krankheitsprocess keine scharfe Grenze zwischen chronisch und akut giebt, sondern dass die beiden Gruppen durch zahlreiche Uebergangsformen verbunden sind, und dass es mehr oder weniger dem subjektiven Ermessen überlassen bleibt, wo man

die Grenze ziehen will. Es giebt Autoren, u. A. Finger¹⁾ welche der akuten Gonorrhoe einen ganz bestimmten „typischen Ablauf“ zuschreiben und die dann konsequenterweise diejenigen Fälle als chronische bezeichnen, welche diesen Typus nicht einhalten.

Da die Aufstellung eines solchen Typus aber nur durch Abstraktion von einer beschränkten Anzahl von Fällen erfolgen kann, so wird durch dieselbe die Beurtheilung des einzelnen Falles keine sicherere.

Indem wir daher von einer bestimmten Definition des Begriffes „chronische Gonorrhoe“ absehen, versuchen wir vielmehr gleich nach den Ursachen zu forschen, aus welchen eine grosse Anzahl von Trippern nicht in 6 oder 8 Wochen abläuft, sondern sich über längere, — oft unbegrenzt lange Zeit hin erstreckt.

Zu diesen Ursachen gehört in erster Linie die Schwierigkeit der Behandlung, welche beruht einmal auf den anatomisch-physiologischen Verhältnissen der von der Gonorrhoe befallenen Organe, dann aber auch auf der Eigenart der die Krankheit erzeugenden Mikroorganismen.

Bei der Therapie der akuten Gonorrhoe ist eine ganze Anzahl von Schwierigkeiten zu überwinden, auf die wir hier nur in aller Kürze hinweisen können: zunächst nämlich ist es schwer möglich, den Gonokokken mit den sie vernichtenden Medikamenten in alle die Schlupfwinkel zu folgen, in welche sie hineinwachsen und in denen sie ungestört vegetiren können: die Krypten und Drüsen der vorderen und hinteren Harnröhre können aus rein anatomischen Gründen auch durch die energischsten Einspritzungen und Ausspülungen nicht berührt werden; es vermögen hier auch bei der sorgsamsten Behandlung virulente Kokkenherde zurückbleiben, die immer wieder bei jedem Aussetzen der Behandlung zu einem Recidiv Veranlassung geben können.

Zweitens ist hervorzuheben, dass wir aus den leider sehr spärlichen, bisher vorliegenden anatomischen Untersuchungen gonorrhoeisch erkrankter Gewebe wissen, dass die Gonokokken nicht wie man wohl anzunehmen geneigt gewesen wäre, bloss im Epithel vorhanden sind, sondern dass sie auch in die allerobersten Schichten des Bindegewebes der Mucosa selbst eindringen können.

¹⁾ Blennorrhoe der Sexualorgane. Wien 1888.

amm¹⁾ hat bei seinen Untersuchungen gonorrhöischer Conjunctivitis die Gonokokken auch unter dem Epithel konstatiren können, allerdings nur im Akmestadium des Krankheitsprocesses, während sie weiterhin ausschliesslich zwischen den Epithelien vorhanden waren. Bei anderen anatomischen Untersuchungen²⁾ liegt nur noch die Arbeit Toutons²⁾ und eine eben erschienene Jadassohns³⁾ über die Gonorrhoe der paraurethralen Gänge vor — waren die Gonokokken nur in den allerobersten Schichten des Epithels zu finden.

So muss vorderhand die Frage unentschieden bleiben, ob in diesen Fällen der Process der wirklichen Heilung schon so nahe war, dass die Gonokokken naturgemäss bereits aus den tieferen Schichten eliminiert waren; oder ob bei diesen, mit mehrfach geschichtetem Epithel ausgekleideten Gängen überhaupt ein tieferes Eindringen der Gonokokken gar nicht stattfindet. Dinkler⁴⁾ hat im Gegentz dazu die Gonokokken sogar in das Gewebe der Cornea und der Iris eindringen sehen; wenn man auch zugeben muss, dass in seinen Fällen besonders ungünstige Verhältnisse vorgelegen haben, so werden wir doch in jedem Fall vorderhand mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass die Erreger der Gonorrhoe nicht bloss ganz oberflächlich liegen — und daraus resultirt naturgemäss die Schwierigkeit mit den antiseptischen Agentien die verschiedenen Gewebsschichten zu durchdringen, denn, — wir gehen damit zu einer weiteren Schwierigkeit der Gonorrhoe-Behandlung bereits über — die Medikamente, welche wir anwenden, sind zwar sehr prompt wirkende Desinficientien — wenigstens gegenüber den keineswegs besonders widerstandsfähigen Gonokokken, aber sie haben alle nur in einem ausserordentlich geringen Grade die Fähigkeit, wirklich in das Gewebe hineinzudringen; sie sind in mehr oder weniger hohem Grade eiweissfällende Agentien und verlegen sich durch diese Eigenschaft gleichsam selbst den Weg in die Tiefe. In diese können wir also eigentlich nur dadurch gelangen, dass wir die Schleimhaut gradezu anätzen; das aber ist ein Weg, welchen wir bei der Gefahr der Strikturbildung grade an der

1) Gonococcus Neisser, Wiesbaden 1887.

2) Arch. f. Derm. u. Syph. 1889.

3) Gonorrhoe der paraurethralen und präputialen Drüsengänge. D. med. Wochenschr. 1890.

4) Graefes Archiv XXXIV. 3.

Harnröhrenschleimhaut am allerwenigsten werden einschlagen dürfen, um so weniger, als wir den nothwendigen Grad der Tiefe der Aetzung vorderhand noch gar nicht beurtheilen können, und eine wirklich sichere Begrenzung derselben nicht möglich erscheint.

Endlich aber ist noch hervorzuheben, dass auch nach der endgültigen Beseitigung der Gonokokken Entzündungszustände in der Harnröhrenschleimhaut zurückbleiben, welche an sich (in vielen Fällen wenigstens) gar keine Bedeutung haben, welche indess der Behandlung meist ausserordentlich hartnäckigen Widerstand leisten.

Abgesehen von den bisher erwähnten, in der Natur des gonorrhoeischen Processes liegenden Schwierigkeiten bei der Behandlung der Gonorrhoe ist noch ein Punkt vorhanden, welcher die Therapie erschwert, weil er einen sehr hervortretenden Mangel in unserer Diagnostik darstellt — das ist die Unzulänglichkeit der Mittel mit welchen wir bisher die Diagnose des locus morbi zu stellen versuchten. Eine lokale Krankheit, wie es die Gonorrhoe ist, muss nothwendigerweise nach unseren heutigen Ansichten auch lokal behandelt werden, und ohne eine genaue Kenntniss des Ortes, an welchem der Herd der Erkrankung sitzt, ist auch eine wirklich rationelle lokale Therapie nicht möglich.

Eine solche zu vermitteln, schien in erster Linie das Endoskop geeignet. Während früher nur der vorderste Theil der Harnröhrenschleimhaut, soweit er sich durch Auseinanderziehen mit den Fingern oder Instrumenten dem Auge zugänglich machen liess, direkt besichtigt werden konnte, wurden vom Anfange dieses Jahrhunderts an verschiedene Instrumente zur Erweiterung und Durchleuchtung der Harnröhre und Blase angegeben, ohne dass sie indess grosser Beachtung gewürdigt worden wären. Der erste, welcher mit einem aus Lampe, Sonde und Reflektor bestehenden Apparate, den er Endoskop nannte, methodisch Untersuchungen anstellte, war Désormaux (1853). Der schwere, komplicirte, unhandliche Apparat Désormaux's fand wenig Anklang; es wurden Verbesserungen von vielen Seiten vorgeschlagen. Tarnowsky veröffentlichte seine vielseitigen endoskopischen Befunde 1872; seinem und vor Allem auch dem Verdienste Grünfeld ist es zuzuschreiben, wenn das Endoskop jetzt mehr gebraucht wird. Während die ersten Instrumente (Désormaux) sehr schwer und unhandlich waren, zeichnen sich die neueren (seit Hacke's 1862 Beleuchtungsapparat und Endoskop trennte) durch grösseren

fachheit aus. Grünfeld benutzte den zur Laryngoskopie ge-
 echnlichen, an der Stirn zu befestigenden Reflektor und ein-
 e konische, innen geschwärzte Tuben, deren Kaliber Char-
 re 18–24 entspricht. Steurer empfahl kürzere Tuben, um
 Beleuchtung zu verstärken; Auspitz gab ein zweiblättriges
 Endoskop, welches geschlossen eingeführt und durch eine Schrau-
 vorrichtung nach Art des Cusco'schen Vaginalspekulums ge-
 het wird, an. (Zu erwähnen wären noch das Antal'sche Aero-
 ethroskop und die Verwerthung elektrischer Beleuchtung in
 m Nitze-Leiterschen Elektroendoskop.)

Das Bild der normalen Urethra im Endoskop ist zunächst
 ten in der pars prostatica ein kurzer dunkelrother Schleim-
 uttrichter von glatter Oberfläche, oder durch zarte, im Bilde
 diär gestellte Längsfalten gerippt. Beim Vorgehen wird die
 Schleimhaut blässer, das caput gallinaginis stellt sich als ziem-
 h gleichmässige karminrothe flachrunde Protuberanz, auf deren
 ippe man das nadelstichgrosse pocular unter günstigen Um-
 inden sehen kann. Allmählich blässer wird die Schleimhaut
 der pars membranacea, die glatt oder radiär liniirt erscheint.
 iter vorn werden infolge der starken Kontraktion der Sphink-
 ren aus dem Trichter zwei sich von beiden Seiten her ins
 esichtsfeld einstellende Wülste — durch den Druck mehr weniger
 ämisch. Unter günstigen Verhältnissen kann man an der
 and dunkle, von einem dunkelrothen Ringe eingeschlossene
 unkte sehen: die Morgagnischen Lakunen. Sofort nach dem
 erlassen der pars bulbosa tritt die Trichterfigur wieder auf;
 e Schleimhaut ist nun sehr blass gefärbt, die Lakunen sind
 t zu sehen. Bei der chronischen Urethritis ändert sich das
 ld. Zunächst Trichterform durch Schwellung und Sukkulenz
 r Schleimhaut verändert; der Trichter wird durch Hineindringen
 r Schleimhaut in das Endoskop kleiner, enger und von einem
 all (anstatt von einem scharfen Rande) begrenzt. Umgekehrt
 achen starre rigide Stellen den Trichter länger, geräumiger;
 einseitige Indurationen machen ihn asymmetrisch; Falten treten
 das Bild. In der pars bulbosa dringen die Wülste sehr weit
 a, umgekehrt bilden sie starre Wände vor dem Endoskop. Die
 Oberfläche nimmt stärkere Röthung an; die glatte, höchstens von
 en radiären Linien durchzogene Schleimhaut ist bald glanz-
 , bald auffallend glänzend; Epithelverluste verleihen ihr ein

gestricheltes Aussehen; sammetartige — trübe — gequollene — granulirte — trachomatöse Stellen verleihen den Bildern Abwechslung.

In neuester Zeit hat auch Oberländer mit einem elektrischen Endoskope, welches sich von den bisherigen dadurch unterscheidet, dass die Lichtquelle in die Harnröhre selbst eingeführt wird, die verschiedensten Bilder chronischer Gonorrhoe gezeichnet, und auf sie eine pathologisch-anatomische Eintheilung der ausserordentlich wechselnden Processe zu begründen versucht.

Ein Urtheil über diese Darstellungen zu geben, ist vorderhand noch ganz unmöglich, denn es fehlt an umfassenden Nachuntersuchungen, und im Gegensatz zu Oberländer, welcher behauptet, nur mit seinem Elektroendoskope liessen sich die Zustände mit dem von ihm erreichten Erfolge studiren, meinen Andere, dass die alte Methode mit reflektirtem Licht zu arbeiten, im Grunde dasselbe, wenn nicht mehr leiste. Das eine muss jedenfalls bereits jetzt betont werden, dass der pathologisch-anatomischen Schilderung Oberländers vorderhand noch die pathologisch-anatomische Grundlage fehlt; andere Autoren, welche sich ebenfalls viel mit der Endoskopie beschäftigt haben, sind der Ansicht, dass sich nur in einer sehr beschränkten Anzahl von Fällen für Diagnose und Therapie mit dem Endoskop mehr erreichen lasse, als mit anderen Methoden. Trotz dessen ist theoretisch zweifellos das Postulat aufrecht zu erhalten, durch direkte Besichtigung sich ein klares und scharfes Urtheil über den anatomischen Zustand der erkrankten Schleimhaut zu verschaffen. Der praktischen Ausführung der Endoskopie aber stehen noch eine Anzahl schwer wiegender Bedenken gegenüber.

Die Enge des Harnröhrenlumens und die Länge ihres Kanals bedingen, dass die endoskopische Untersuchung weit schwieriger ist, als die analogen Untersuchungsmethoden des Kehlkopfes, des Ohres und Auges — zum mindesten gehört eine weit grössere Uebung dazu, die kleinen und durch den Druck des Instruments selbst ausserordentlich variablen Bilder richtig beurtheilen zu lernen; gewiss ist das kein Einwand, welcher den theoretischen Werth der Methode beeinträchtigt — ihre praktische Bedeutung aber setzen diese Schwierigkeiten doch erheblich herab.

Wenn man durch die Endoskopie bisher wirklich fundamentale Aenderungen in unseren Anschauungen über Diagnose und

1) So z. B. auch Finger.

therapie des Trippers herbeigeführt hätte, dann würde allerdings die Nothwendigkeit vorhanden sein, jeden Medizin Studierenden auch in diese Technik einzuführen, wie das bei der Laryngoskopie und Ophthalmoskopie schon längst geschieht. Die praktischen Resultate aber sind bisher zu unscheinbare gewesen, als dass man sich hätte veranlasst sehen können, das medizinische Studium auch auf diesen Zweig auszudehnen. So wird denn die Endoskopie vorderhand noch auf den engen Kreis der Spezialisten beschränkt bleiben, unser Bestreben muss aber naturgemäss darauf gerichtet sein — grade bei einem so häufigen Leiden, wie es der chronische Tripper darstellt — Untersuchungsmethoden zu finden, welche alle praktischen Aerzte ausüben und zu verwerthen im Stande sind. Dazu kommen noch einige weitere Momente, welche die Bedeutung der Endoskopie einschränken. Die Zeit, in welcher man ohne jede Gefahr endoskopiren darf, ist eine sehr beschränkte. Solange noch Kongestionen der geringfügigsten Art bestehen, muss man befürchten, dieselben durch die Einführung des Instrumentes zu steigern und eine schleimige Absonderung in eine eitrige zu verwandeln. Ungleich milder ist die Untersuchung mit der Sonde, und aus diesem Grunde empfiehlt Tarnowsky, die Endoskopie nur dann vorzunehmen, wenn die Patienten schon durch mehrfache Sondenuntersuchung den Reiz derselben kennen gelernt haben. Im akuten Stadium der Gonorrhoe und solange einigermaßen lebhaftere Entzündungserscheinungen vorhanden sind, verbietet sich die Einführung von Instrumenten, wie das Endoskop eins ist, von selbst. Endlich ist man auch bei Anwendung des Endoskops keineswegs in der Lage, in jedem Falle bestimmte und sichere Resultate zu erhalten, weil die genaue endoskopische Durchmusterung der ganzen Urethra eine sehr schwierige Aufgabe ist. Indess ist es auch kaum nothwendig, bei jeder chronischen Gonorrhoe die ergriffene Stelle genau herauszufinden. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich ja um diffuse Erkrankungen, bei welchen die gesammte Schleimhautoberfläche behandelt werden muss.

Ein Punkt aber muss bei der Behandlung der Gonorrhoe überhaupt, wie speciell bei der chronischen, eine ganz besondere Berücksichtigung erfahren — er darf in keinem Falle vernachlässigt werden, und an der geringen Beachtung, die man ihm bisher geschenkt hat, liegt es wohl zum grössten Theil, dass die

Therapie der Gonorrhoe bisher so unzulängliche Resultate ergeben hat. Wir verdanken die Kenntniss von der Bedeutung dieses im Folgenden etwas eingehender zu besprechenden Verhältnisses wesentlich französischen Autoren; in Deutschland hat zuersst Ultzmann¹⁾ die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt.

Die männliche Harnröhre zerfällt nach unserer heutigen Anschauung in zwei grössere Abschnitte, welche man am einfachsten als vorderen und hinteren bezeichnet; dieselben werden von einander getrennt durch den m. compressor externus urethrae, welcher mit seinen kräftig entwickelten Ringfasern die pars membranacea umfasst — vor ihm liegt die pars bulbosa und pendula, hinter ihm der Rest der membranacea und die prostatica.

Nicht bloss anatomisch sind diese Theile geschieden, sondern auch ihre physiologische Bedeutung ist eine sehr differente. Die pars anterior stellt ein häutiges Rohr dar, dessen Wandungen normalerweise an einander liegen, durch den geringsten Druck aber von einander getrennt werden, und welches keine andere Funktion hat, als den Harn, sowie das Sekret der Genitaldrüsen nach aussen abzuführen. Die pars posterior ist ein von kräftiger Muskulatur umschlossenes Rohr, in welches die Ausführungsgänge der Genitaldrüsen münden, und welches den Zweck hat, dem Abschluss der Blase nach vorn zu ermöglichen. Die Frage, ob es neben diesem Verschlussapparat noch einen eignen sphincter vesicae giebt, ist noch nicht ganz erledigt.

Henle²⁾ findet ein dünnes Bündel glatter Muskelfasern am collum vesicae, ist indess der Ansicht, dass sie nicht den Zweck haben, die Blase gegen die Urethra abzuschliessen, sondern vielmehr die völlige Entleerung derselben zu bewirken; er sieht den eigentlichen Verschluss in der pars prostatica. Budge³⁾ legte bei Hunden die Ureteren bloss, füllte durch dieselben die Blase unter einem solchen Druck mit Wasser, dass letzteres abfliessen musste: elektrische Reizung der Muskulatur der pars membranacea und prostatica sistirte sofort das Abfliessen; nicht dagegen vermochte Reizung des ostium vesicale nach Abtrennung der pars prostatica die Blase vollkommen zu verschliessen. Es vermag also die Blase an sich der Flüssigkeit den Abfluss nicht zu

1) Ueber Pyurie. Wiener Klinik IX.

2) Handbuch der syst. Anat. des Menschen. Braunschweig 1863.

3) Physiologie der Blasenmuskeln. Plügers Archiv VI.

erwehren; ihr Verschluss besteht in dem Tonus der vorliegenden Urethralabschnitte: der pars prostatica und membranacea.

Wie dem aber auch sein mag, für unser Gebiet ist die That-
sache, dass die Stelle des „Blasenschlusses“, da wo der innere
Schliessmuskel der Blase sitzt, einen weit geringeren Widerstand
bietet als der m. compressor urethrae, d. h. der Anfangstheil der
Urethra posterior, vollständig genügend, um die Bedeutung der
Theilung in urethra anterior und posterior für die Klinik ins
hellste Licht zu setzen.

Diese Thatsache lässt sich noch in verschiedener Weise
bestätigen. Führt man beispielsweise einen weichen Katheter,
welcher durch einen Schlauch mit einem Irrigator verbunden
ist, in die Urethra ein, so fliesst die Flüssigkeit so lange
aus dem orificium urethrae externum wieder zurück, als das
Fenster des Katheters sich vor dem m. compressor befindet;
dann kommt beim Weitervorschieben des Katheters, wobei man
deutlich den Widerstand des Muskels bemerkt, ein Punkt, an
welchem die Flüssigkeit gar nicht ausströmt — naturgemäss, weil
der kontrahirte Muskel die Schleimhaut in das Katheterfenster
gleichsam hineinpresst — und nachdem diese Stelle überschritten
ist, läuft die Spülflüssigkeit nicht mehr nach vorn, sondern in
vollem Strom in die Blase. Das aber ist der Fall, ohne dass
etwa das Fenster des Katheters sich bereits in der Blase befände;
nicht bloss, dass die Länge des eingeführten Katheterstücks nicht
dem bekannten Masse der urethra entspricht, man kann auch
durch ein sehr einfaches Experiment den Nachweis führen, dass
die Katheteröffnung von der Lichtung der Blase noch ein — in
den verschiedenen Fällen in seiner Länge etwas differirendes —
Stück entfernt ist. Hört man nämlich, nachdem man einen Theil
der Flüssigkeit in die Blase hat einlaufen lassen, damit auf und
entfernt dann den Schlauch von dem Katheter, so müsste, wenn
letzterer sich bereits mit seiner Öffnung in der Blase befände,
deren Inhalt nunmehr auslaufen; das ist aber nicht der Fall,
auch dann nicht, wenn die Menge der eingeströmten Flüssigkeit
eine relativ beträchtliche ist, wenn also das Katheterfenster inner-
halb der Blase bereits nothwendigerweise in die Flüssigkeit ein-
tauchen müsste. Man muss vielmehr in solchen Fällen den Katheter
noch mindestens 1—2 cm, meist mehr, vorschieben, um eine Ent-
leerung der Blase zu ermöglichen.

Ganz dieselbe Erfahrung machen wir, wenn wir die von Uitzmann zur Behandlung der Urethritis posterior angegebenen Instrumente benutzen: dieselben sind grade 16 cm lang, d. h. sie entsprechen der Durchschnittslänge der pars anterior urethrae; führt man sie ein, so gelangt man mit ihnen in den Anfangstheil der pars posterior und spritzt nun die in ihnen enthaltene Flüssigkeit, ohne Widerstand zu spüren, durch die pars posterior in die Blase. In anderer Weise hat Casper¹⁾ den engen Zusammenhang zwischen pars posterior urethrae und Blase demonstrirt. Er liess, nachdem einige Tropfen gelber Blutlaugensalzlösung in der pars posterior deponirt waren, nach einiger Zwischenzeit in drei Absätzen uriniren. Wäre von der Lösung etwas nach vorn gedrungen, so wäre es auch am orificium urethrae erschienen; — Jamin²⁾ zeigte, dass zwei Tropfen einer Flüssigkeit in den Bulbus injicirt, am Orificium zum Vorschein kommen, während er hinter dem Compressor selbst 40 Tropfen injiciren konnte, ohne dass sich nur einer an demselben gezeigt hätte; — wäre die Lösung in der pars posterior geblieben, so hätte der erste Urin die Hauptmenge weggeschwemmt, der zweite konnte allenfalls Spuren enthalten, der dritte musste frei sein. Die Farbenreaktion mit Eisenchloridlösung ergab nun in allen drei Theilen fast gleiche Mengen von Blutlaugensalz, ein Beweis, dass die Lösung mindestens zum grossen Theil nach der Blase abgeflossen war. Endlich geht die grosse Widerstandskraft des contrahirten m. compressor urethrae auch daraus hervor, dass es gemeinhin nur durch Anwendung grosser Kraft, welche sich, wie es in neuerer Zeit von französischen Autoren geschehen ist, für den einzelnen Fall zahlenmässig berechnen lässt, gelingt, durch einfaches Einspritzen in die urethra anterior, Flüssigkeit in die Blase zu bringen; nur unter gewissen, meist pathologischen Verhältnissen kann man das durch den bei dem gewöhnlichen Einspritzen verwendeten Druck erreichen. Ich komme darauf weiterhin zu sprechen; aus dem bisher Erörterten geht zur Genüge hervor, dass in der That die urethra posterior physiologisch mehr zur Blase gehört, als zur anterior; nur noch einen Umstand müssen wir, um dann die für die Klinik daraus folgenden Schlüsse ableiten zu können

¹⁾ Therapëut. Monatshefte 1887.

²⁾ Etude sur l'urethritide chronique. Paris 1883.

kurz betonen: dass nämlich die urethra posterior nur eine kapillare Lichtung besitzt und dass dünnflüssige Massen, welche in diesen Raum hineingelangen, nothwendigerweise nach dem Ort abfließen müssen, an dem ihnen der geringste Widerstand entgegensteht, d. h. also nach der Blase. Der Tonus der die ganze hintere Harnröhre umgebenden Muskulatur wird ebenfalls dazu beitragen, diese Herausbeförderung zu unterstützen. Gegen diese auf möglichst wenige Voraussetzungen aufgebaute Deduction hat wesentlichste Einwände eigentlich nur v. Zeissl¹⁾ erhoben. Die hauptsächlichsten derselben, deren Widerlegung in aller Kürze versucht werden mag, sind folgende:

Einmal nämlich meint Zeissl, dass bei Blutungen aus der hinteren Harnröhre das Blut auch aus dem orificium externum urethrae herausflüsse, dass diesem also der vermeintliche Widerstand des m. compressor den Weg nicht versperre. Dagegen lässt sich nun zunächst einwenden, dass es mit aller Sicherheit constatirte Blutungen aus der urethra posterior giebt, bei denen das Blut nicht nach vorn ausströmt, sondern in die Blase abfließt; einen solchen Fall hat Horowitz²⁾ beschrieben, und erst in letzter Zeit ist auch in der Breslauer dermatologischen Klinik dasselbe beobachtet worden. Während nämlich nach längerer Retention der Urin in beiden Portionen blutig tingirt entleert wurde, konnte man einen blutfreien Urin erhalten, wenn man dem Patienten einen Katheter einlegte und durch diesen den frisch in die Blase gelangten Urin auffing; damit war der Beweis geliefert, dass der Urin in der That dadurch mit Blut vermischt wurde, dass letzteres aus der Urethra in die Blase überfloss.

Auf einen zweiten Punkt ist erst in neuester Zeit aufmerksam gemacht worden und zwar von Bazzy³⁾; dieser hat darauf hingewiesen, dass auch die Blutung am Ende des Urinirens, welche immer als aus der urethra posterior kommend angesehen wurde, sehr wohl von Schleimhautverletzungen in der urethra anterior herrühren könne. Noch weit augenscheinlicher aber ist dieses der Fall, wenn das Blut wirklich aus der urethra anterior — auch ausserhalb der Zeit des Urinirens — herauskommt.

¹⁾ Lehrbuch der Syphilis. Stuttgart 1888. Ihm schliesst sich auch Fürbringer in seinem Lehrbuch mit im Ganzen übereinstimmenden Argumenten an.

²⁾ Zur Behandl. d. blennorrh. Haematurie. V. für Derm. u. Syphilis 1885.

³⁾ De l'hématurie terminale dans la miction. La semaine med. 1887. 46.

Es ist in der That, (selbst mit dem Endoskop), sehr schwer, die Bestimmtheit zu constatiren, ob nicht ein Riss auch in der urethra anterior vorhanden ist oder wenigstens in sie übergreift — ist sehr wohl möglich, dass in den Fällen, auf welche v. Zeissl sich bezieht, das Blut auf diese Weise in dieselbe gelangt ist.

So wenig wie die Haematurie, giebt unseres Erachtens auch die Spermatorrhoe und die Prostatorrhoe Anlass, an der obigen gegebenen Darstellung zu rütteln. Denn bei diesen Zuständen handelt es sich gerade um Erkrankungen desjenigen Apparates, dem wir die grösste Bedeutung zuschreiben mussten, nämlich der Muskulatur; ihre Erschlaffung wird von vielen Seiten gerade als der wesentlichste Theil des Symptomencomplexes aufgefasst; das kommt bei denjenigen Formen der Prostatorrhoe und Spermatorrhoe, welche nur bei Defäkation auftreten, noch der Druck der Bauchpresse, welcher die Herausbeförderung dieser Sekrete unterstützt; in keinem Fall also wird man berechtigt sein, die Verhältnisse auf die Norm zu übertragen, und aus der abnormalen Schwäche des compressor urethrae bei solchen Patienten Schlüsse auf seine normale Leistungsfähigkeit zu machen. — Endlich hebt Zeissl noch hervor, dass er mittels einer grossen Spritze den Widerstand des m. compressor urethrae fast bei allen seinen Patienten überwinden könne. Das ist gewiss möglich; aber die Flüssigkeitsmenge, welche er dabei verwendet, und der Druck, den er einwirken lässt, entsprechen doch keineswegs denen, welche unter gewöhnlichen Verhältnissen zur Wirkung kommen, und bleibt gewiss, wie Finger mit Recht betont, ein etwas gewagtes Experiment, in dieser Weise therapeutische Einspritzungen machen zu lassen, weil man dabei Gefahr läuft, die normale Kraft des Muskels zu schädigen.

Trotz Zeissl's Widerspruch muss also die Lehre von der Bedeutung der Zweitheilung der Urethra aufrecht erhalten werden und es wird in jedem Falle darauf ankommen, zu constatiren, ob einer oder beide Abschnitte erkrankt sind. Bei der Diagnose wie bei der Therapie der akuten und besonders der chronischen Gonorrhoe werden wir diesen Punkt zu berücksichtigen haben.

Wie schnell die akute Gonorrhoe vom orificium externum nach hinten weiter schreitet, davon haben wir keine bestimmte Vorstellung; während beispielsweise Grünfeld meint, dass sie

schnell die gesammte Oberfläche der urethra anterior befallen sei, glauben Andere, z. B. Finger, dass der Prozess langsam von Stelle zu Stelle fortschreite; wahrscheinlich herrschen auch in dieser Hinsicht grosse individuelle Unterschiede vor, welche von der Intensität des Processes abhängen. Wie dem auch sei, in jedem Falle sind die Symptome, welche der gonorrhoeische Process in der ganzen Ausdehnung der urethra anterior macht, einförmig und nur mit dem Stadium wechselnd, in welchem sich die Entzündung befindet. Anders aber verhält es sich in dem Augenblick, in welchem die Propagation nach der urethra posterior stattfindet, in welchem die Grenze des compressor überschritten wird. Der Zeitpunkt, an welchem das geschieht, ist ein sehr verschiedener; er kann bereits in die erste Woche der Gonorrhoe fallen — besonders wenn irgend welche Schädlichkeiten einwirken — oder er kann beliebig lange hinausgeschoben sein — und wenn man auch die dritte Woche etwa als die Zeit ansehen kann, in welcher die Urethritis posterior durchschnittlich am häufigsten entsteht, so hat die Angabe dieses Zeitpunktes doch ebensowenig Werth, wie eine statistische Berechnung der Häufigkeit der Urethritis posterior bei allen Gonorrhoeen überhaupt, weil bei allen derartigen Berechnungen auf die Behandlung und das sonstige Verhalten der Patienten das grösste Gewicht gelegt werden muss. Wir kommen auf diese Verhältnisse noch weiterhin zu sprechen.

Wenn wir jetzt den Versuch machen wollen, das Symptomenbild der Urethritis posterior zu schildern, so müssen wir zunächst auf zweierlei aufmerksam machen: während nämlich die Urethritis gonorrhoeica anterior in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle als ein akuter Entzündungsprocess mit reichlicher eitriger Sekretion und den bekannten Characteristicis akuter Entzündung überhaupt einsetzt, und erst weiterhin in ein chronischeres Stadium übergeht, kann die Urethritis posterior in zweifacher Weise beginnen und thut es in einer wechselnden Zahl von Fällen, über deren Verhältniss bestimmte Angaben zu machen schwer ist. Entweder nämlich entsteht die Urethritis posterior ebenfalls ganz akut und wird erst im weiteren Verlaufe chronisch oder sie setzt von vornherein in einer schleichenden, absolut nicht stürmischen Weise ein und weist so von Anfang an einen mehr chronischen Charakter auf. Im klinischen Bild weicht natürlich nur der Beginn beider

Erkrankungsformen von einander ab — weiterhin sind Differenzen nicht mehr vorhanden.

Das klinische Bild der Urethritis posterior acuta ist das folgende: von subjektiven Symptomen ist ein lästiger Harndrang das erste; seine Intensität dem Grade der Erkrankung proportional. Die Patienten werden in den schwersten Fällen ununterbrochen davon gequält und sehen sich gezwungen, alle 5 bis 10 Minuten die geringe Menge Harn zu entleeren, welche sich in dieser kurzen Zeit angesammelt hat. Nach dem Harnen dauert der Drang unverändert fort; es ist dies die physiologische Folge einer Reizung der pars prostatica, gänzlich unabhängig vom Füllungszustande der Blase. In schweren Fällen kann durch Reflexwirkung ein solcher Krampf des Muskels ausgelöst werden, dass vollständige Harnverhaltung auftritt: spasmodische Strikturen (dieselbe vergesellschaftet sich mit Krampf des Mastdarmsphinkters). Ein Gefühl von Druck und Schwere ist ein weiteres subjektives Symptom. Brennen, Kitzeln in den tiefen Theilen der Urethra und gegen den After hin — nehmen nach der Urin- und Stuhlentleerung oft an Intensität bedeutend zu. Häufige Ejakulationen finden sich, während Priapismus und schmerzhaftere Erectionen gewöhnlich fehlen; die Pollutionen sind meist von stechenden Schmerzen begleitet; sie sind eine Folge der Reizung des caput gallinaginis: ein äusserst charakteristisches Symptom. Das wesentlichste der objektiven Symptome ist die Sekretion, welche bei der urethritis anterior in wechselndem Verhältniss schleimig-eitrig, insofern bei Exacerbationen mehr Eiter producirt wird, der dünnflüssige reichliche Eiter der urethritis posterior fliessen den oben auseinandergesetzten anatomischen Verhältnissen entsprechend in die Blase; daher ist nicht nur die erste Urinportion durch die Beimischung des aus der urethra anterior ausgespülten Sekrets getrübt, sondern auch die zweite, — ein Symptom, auf dessen Bedeutung ich bei der Diagnose zurück kommen werde. In sehr akuten Fällen tritt auch Blutharnen ein, manchmal zeigt sich Blut in den letzten Harntropfen. Bei stärkerer Blutung dringt das Blut, wie das Sekret in die Blase, und es werden zwei Portionen blutig tingirten Harns entleert. Eine eigenthümliche noch nicht ganz aufgeklärte Erscheinung ist die der Intensität des Harndrangs entsprechende Albuminurie; sie tritt mit ersterem auf, steigert sich, fällt und ver-

windet mit ihm. Die Eitermengen stehen in gar keinem Ver-
 triss zu der Eiweissmasse. Nach Fürbringer¹⁾ und Rune-
 rg²⁾ soll das Eiweiss in Folge der Zunahme des Drucks in
 den Harnkanälchen entstehen, und in der That kann bei Harn-
 entzündung ein solcher zu stande kommen. Es werden durch die akute
 Entzündung der pars posterior reflektorische Muskelkrämpfe aus-
 gelöst, an denen sich die Sphinkteren und aller Wahrscheinlich-
 keit nach auch die Detrusoren betheiligen. Durch die krampf-
 hafte Contraktion der letzteren nun wird das untere Ende der
 Harnblase, welches von ihnen umschlossen ist, comprimirt und so
 eine Stauung des Harns in den Harnleitern zu Stande gebracht.
 In den Vordergrund der Erscheinungen tritt aber der enorme
 Harnandrang; derselbe ist so quälend, dass er den Patienten voll-
 kommen beherrscht, ihn zu lauten Klagen veranlasst, ihm den
 Schweiß auf die Stirn treibt. Im akutesten Stadium tritt
 ein allgemeiner Verfall ein: Muskelzittern, tiefe Blässe der Haut und
 Schleimhäute; auch Fieber pflegt sich einzustellen. Die psy-
 chische Depression verfehlt nicht ihren Eindruck auf die Ver-
 dauungsorgane: der Appetit liegt total darnieder, Stuhlträgheit
 der hartnäckigsten Art, Abgeschlagenheit, fahle Gesichtsfarbe,
 Schlaflosigkeit begleiten dieses Stadium. Während so die Be-
 schwerden und objektiven Symptome der Urethritis posterior sehr
 in den Vordergrund treten, verlieren die der anterior meist an Be-
 deutung; das Sekret wird oft plötzlich geringer, mehr mukös;
 das Brennen in der vorderen Harnröhre erscheint unbedeutend
 im Vergleich zu dem Tenesmus in der hinteren. Nachdem diese
 heftigen Symptome eine wechselnde Zeit angehalten, eilt die
 Urethritis in der Mehrzahl der Fälle rasch ihrer Akme zu; in
 diesem Stadium liegt die Gefahr der komplikatorischen Entzündung
 von Prostata, Blase, Nebenhoden sehr nahe. Nach der Akme
 nimmt die Urethritis häufig einen schleppenden Charakter an,
 durch Recidive, häufige Pollutionen wird der Process immer mehr
 in die Länge gezogen und die Entstehung eines chronischen Zu-
 standes herbeigeführt.

Das Bild der chronischen Entzündung der pars posterior,
 wie bereits erwähnt, auch manchmal von vornherein in dieser

¹⁾ Krankh. d. Harn- und Geschlechtsorgane. Braunschweig 1889.

²⁾ Ueber die pathogenetischen Bedingungen der Albuminurie. Deutsch.
 Arch. f. Kl. Med. 1879.

Form besteht, wird nun aus vielen Gründen verschwommen. Während das Secret einer Urethritis anterior acuta selbst sehr geringer Quantität immer noch das orificium urethrae reicht, daselbst besonders morgens als gelblicher, weisslich grauweisslicher Tropfen erscheint, tagsüber nur eine leichte Verklebung des Orificiums hervorbringt, welche beim Urinlass bemerkt wird, kann bei der Urethritis chronica posterior je Spur von Sekret am orificium externum fehlen; ist es — wie einer grossen Anzahl von Fällen — vorhanden, so weist darauf hin, dass zugleich mit der posterior auch eine Urethritis anterior besteht; das von der ersteren gelieferte Sekret kann in etw. frischeren Fällen und bei Rekrudescenzen des Processes noch dünnflüssig und reichlich sein, dass es — wie bei der acuta — in die Blase abfliesst, und dann den Urin in seiner Gesamtmenge trübt; die Zweigläserprobe fällt dann — zum mindestens zeitweise — positiv aus. Häufiger aber und namentlich bei allen wirklich chronischen Fällen wird auf der urethra posterior nur geringe Menge eines zähflüssigen schleimigen Sekrets produziert, dieses kann wegen seiner physikalischen Eigenschaften nicht „fliessen“, es bleibt dann naturgemäss auf der Schleimbaut der urethra posterior liegen, mischt sich dem in der Blase befindlichen Urin nicht bei und macht sich darum auch nicht als Trübung der zweiten Portion geltend — auf die Schwierigkeiten, welche dieses Verhältniss für die Diagnose darbietet, muss ich weiter noch eingehen. Dazu kommt aber, dass subjektive Symptome bei dieser Form ganz fehlen können; sind solche vorhanden, bestehen sie in leichtem Brönnen oder Kitzeln beim Uriniren besonders nach Excessen.

Welch enormen Einfluss die im Obigen entwickelten Symptome nicht nur auf die erkrankten Organe selbst, sondern die ganze physische und psychische Thätigkeit des Gesamtnismus ausüben, darauf kommen wir noch zurück. Im Vordergrund stehen meist leichte vorübergehende, dumpfe, stechende, brennende Schmerzen, die im Mittelfleisch nach Hoden und After ausstrahlen und sich mit Neurosen kombiniren können, wie sie der Neurasthenia spinalis eigenthümlich sind. Diese Punkte sind dann auch gegen Druck empfindlich, schmerzen bei Sondenuntersuchung. Mitunter treten auch unangenehme Krampferscheinungen am Schlusse des Urinirens auf. Auf die ganze Summe von Komplikationen, welche

dieser Form der Urethritis posterior, wie bei der vorgeschil-
ten eintreten können, darf ich an dieser Stelle nicht eingehen;
kann hier nur in aller Kürze hervorheben, dass so lange
entzündliche Processe in der urethra posterior bestehen,
Möglichkeit gegeben ist und nur allzuoft zur Wirklichkeit
rd, dass die mit der hinteren Harnröhre in mehr weniger engem
sammenhang stehenden Organe (ductus ejaculatorii, funiculi
ermatici, Nebenhoden, Samenbläschen, Prostata, Blase) in den
tzündlichen Process hineingezogen werden — und ferner, dass
ch die weniger unmittelbaren Complicationen der Gonorrhoe, so in
erster Linie der vieldiskutirte gonorrhoeische Gelenkrheumatis-
is so lange auftreten können, als die Urethritis noch fortbesteht.

Ein Moment aber bedarf noch einer gesonderten Besprechung,
es nicht bloss von allgemein pathologischem Interesse, sondern
auch für die Praxis von ganz hervorragender Bedeutung ist, und
tatsächlich zur Scheidung der Urethritis posterior in zwei grosse
ruppen Anlass giebt, die — klinisch oft sehr schwer unter-
scheidbar — doch getrennt werden müssen, denn sie haben eine
hr verschiedene Bedeutung: es handelt sich darum in jedem
nzelnem Falle zu entscheiden, ob die vorhandene und objektiv
achweisbare Entzündung der urethra posterior eigentlich go-
orrhoeischer Natur ist, das heisst, ob sie Gonokokken im
ekret enthält und durch sie unterhalten wird, oder ob sie nicht
ehr specifischer Natur ist. Ich gehe damit zugleich auf die
rage der Aetiologie der Urethritis posterior über. Von der Ure-
thritis anterior wissen wir, dass sie in der ganz ungeheuer überwie-
enden Mehrzahl der Fälle durch die Gonokokken erzeugt wird
id wir bezeichnen, dem heutigen ätiologischen Standpunkt
er Medizin entsprechend, nur denjenigen Process als eine
gonorrhoe, einen Tripper, welcher in der That durch die
onokokken hervorgerufen ist. Differentialdiagnostisch kommen
abei wesentlich nur zwei Gruppen in Betracht: erstens alle
iejenigen Entzündungen, welche durch mechanische oder che-
ische Reize in der Harnröhre hervorgerufen werden, also die
rethritiden nach Katheterismus, durch Einspritzung reizender
lüssigkeiten, durch die Bepflügelung mit Urin, welcher reizende
stoffe (Canthariden etc.) enthält, und zweitens die sogenannte
seudogonorrhoe, d. h. ein klinisch der Gonorrhoe ausser-

ordentlich ähnlicher Katarrh der Harnröhre, welcher aber nicht auf der Invasion von Gonokokken noch auf sonstigen uns bekannten Reizen beruht, sondern nach der Anschauung der Mehrzahl der Autoren (Bockhardt, Finger, Legrain etc.) auf das Eindringen anderer Mikroorganismen in die Harnröhre. Ich kann an dieser Stelle auf dieses ebenfalls noch wenig aufgehellte Gebiet nicht eingehen, nur soviel muss ich hervorheben, dass nach den an der Breslauer dermatologischen Klinik gemachten Erfahrungen die Pseudogonorrhoe ausserordentlich selten sein muss, wenn man auch nicht das Recht hat, ihr Vorkommen gänzlich in Abrede zu stellen. Die beiden erwähnten Gruppen von nicht eigentlicher gonorrhöischer Urethritis können nun auch zu einer Urethritis posterior Anlass geben; bei der ersten — mechanische und chemische Urethritis — ist das eigentlich selbstverständlich, denn da die geschilderten Reize die urethra posterior so gut wie die anterior treffen können, respektive müssen (Harngriesel etc.) so wird auch die urethra posterior auf sie mit einer Entzündung antworten; und bei der Pseudogonorrhoe müssen wir nach dem bisher vorliegenden Material ebenfalls annehmen, dass sie nach der urethra posterior vorschreiten kann — denn Bockhardt hat bei seinen Fällen auch Epididymitis beobachtet und es ist wohl solche kann doch gemeinhin nur dadurch entstehen, dass ein entzündliche Process über die urethra posterior in die ductus ejaculatorii u. s. w. vordringt.

Diese beiden Vorkommnisse aber — traumatische und pseudogonorrhöische Urethritis posterior — sind jedenfalls ausserordentlich selten gegenüber der ungeheuren Mehrzahl der Fälle, denen sich die Entzündung der hinteren Harnröhre an einen gewöhnlichen Harnröhrentripper anschliesst. Die erste Frage, welche unter diesen Umständen aufgeworfen werden muss, ist naturgemäss die, ob diese Folgekrankheit des Trippers wie dieser selbst durch die Gonokokken hervorgerufen wird. Der Nachweis der Gonokokken in der urethra posterior ist natürlich schwieriger, als der in der urethra anterior; aber wenn man — etwa nach der unten noch zu besprechenden Weise — die Entzündungsprodukte der urethra posterior isolirt, so kann man in ihnen durch die bekannten Färbemethoden die Gonokokken in ganz charakteristischer Weise auffinden und kann sich auch die Sicherheit verschaffen, dass die gefundenen Mikroorganismen wirklich :

urethra posterior stammen. Aber nicht in jedem Fall gelingt der Nachweis. Wir wissen von dem Tripper der vorderen Harnröhre schon längst, dass es nicht immer möglich ist, die Gonokokken in dem Sekret aufzufinden; ganz abgesehen von den therapeutischen Eingriffen giebt es in jedem Fall ein Stadium, in welchem Sekret zwar noch vorhanden ist, Gonokokken aber nicht bloss vorübergehend, sondern wirklich dauernd fehlen; es ist das das nicht-specifiche Nachstadium der Gonorrhoe, mit welchem diese abschliesst; die Schleimhaut kehrt nicht plötzlich mit dem Absterben der letzten Gonokokken zum Normalzustand zurück, sondern ihre entzündliche Reaktion bleibt noch bestehen, ja sie kann gradezu „aeternisirt“ werden; es kann ein chronischer Katarrh der gesamten Mukosa oder einzelner Stellen resultiren, der — vielleicht nur durch die mechanische Wirkung des vorbeiströmenden Harnstrahles unterhalten — selbst durch energichem therapeutischen Vorgehen einen ausserordentlichen Widerstand entgegensetzt. Diesem chronischen, nicht specifichen, nicht ansteckenden Katarrh der anterior entspricht naturgemäss ein analoger Zustand in der urethra posterior — in seinen Symptomen unterscheidet sich dieser weniger von dem wirklich virulenten Katarrh; bald fehlen Beschwerden vollständig, bald sind sie unbestimmter Natur; meist ist die Sekretion der hinteren Harnröhre so gering, dass es zu einer Trübung des Gesamtturins nicht kommt, — manchmal kann sie aber doch beträchtlicher werden und dann giebt auch die Zweigläserprobe ein positives Resultat. Im allgemeinen unterscheidet sich die Urethritis posterior gonorrhoeica von gonorrhoeica am meisten durch ihren Verlauf: So lange die Gonokokken noch in der Harnröhre an irgend einer Stelle vorhanden sind, kann es noch zu einem akuten Recidiv der Gonorrhoe kommen, indem die Kokken bei irgend einer Gelegenheitsursache wieder unter günstige Ernährungsverhältnisse gesetzt werden, sich reichlich vermehren und frische Entzündungserscheinungen hervorrufen. Die specifiche chronische Urethritis posterior also wird häufigere und stärkere Exacerbationen darbieten, als die nicht specifiche, — Exacerbationen eventuell nicht bloss der selbst zukommenden Symptome; auch ein plötzliches Wiedereröffnen der Urethritis anterior mit reichlicher Sekretion kann bei vorkommen.

Auf die Möglichkeit, die beiden zuletzt erwähnten Formen

der Urethritis posterior durch mikroskopische Untersuchung unterscheiden, komme ich noch weiterhin zu sprechen. Ich möchte ich bezüglich der Aetiologie der Urethritis posterior noch zweierlei erwähnen: einmal muss ich betonen, dass von manchen Autoren, (u. A. auch Legrain) auf das Vorhandensein von anderen Bakterien in der chronisch erkrankten Urethra grosses Gewicht gelegt wird, und dass diese gradezu verantwortlich gemacht werden für das Fortbestehen der chronischen Entzündung. Wenn Legrain soweit geht, diese fremden Bakterien auch dann in den Vordergrund zu stellen, wenn Gonokokken ebenfalls noch vorhanden sind, so kann man ihm in diesem Gedankengang nicht folgen — denn für diese Fälle genügen Gonokokken vollkommen zur Erklärung der Entzündungserscheinungen; in andern Fällen finden sich in der That bald in dem Sekret der urethra anterior, bald in dem der posterior so viele Mikroorganismen — häufig einer Art — dass man den Gedanken sie hätten eine gewisse Bedeutung wenigstens für die Unterhaltung des Katarrhs, nicht völlig von der Hand weisen kann. Es muss jedoch betont werden, dass irgend ein Beweis für diese Anschauung bisher nicht geliefert ist.

Dann aber ist es nothwendig, an dieser Stelle auf alle Momente hinzuweisen, welche die Umwandlung der einfachen Urethritis anterior in eine posterior veranlassen und begünstigen können.

Es ist zweifellos, dass auch ohne dass irgend eine mit Sicherheit zu eruirende Schädlichkeit in den Verlauf der Gonorrhoe eingreift, der Process sich auf die hintere Harnröhre verbreiten kann; es geschieht das bei jeder Art der Behandlung, auch derjenigen, welche nach den Erfahrungen der Breslauer Klinik für die wirksamste und sicherste gehalten werden muss: bei von vornherein mit parasiticiden Mitteln vorgehenden.

Wenn auch die Grenze zwischen urethra anterior und posterior dem Vorwärtsschreiten des Processes zweifellos einen grossen Widerstand entgegensetzt, so genügt dieser doch nicht immer, und es wäre keineswegs berechtigt, in allen Fällen, bei welchen gradezu schädliche Einwirkungen fehlen, den ungünstigen Verlauf auf eine Schwäche des Organismus auf alle möglichen Hypothesen oder auf eine Funktionsunthätigkeit der Muskulatur der Urethra zu beziehen. Ob die ersterwähnten Momente in die

sicht irgend eine Bedeutung haben, ist zum mindesten sehr zweifelhaft — nachweisen lässt es sich jedenfalls bisher nicht; dass der Tonus der Muskulatur ein Hinderniss für die Verbreitung der Entzündung sein, und dass seine Verminderung die Heilung begünstigen kann, ist leicht zu verstehen.

Wichtiger aber für das Zustandekommen der Urethritis posterior sind zweifellos andere Momente.

In erster Linie ist hier die Bedeutung der Therapie zu erwähnen. Ohne des Näheren auf die Anschauungen einzugehen, welche auf dem Gebiete der Gonorrhoe-Behandlung noch immer unversöhnt einander gegenüberstehen, muss ich doch hervorheben, dass man wesentlich drei Richtungen unterscheiden kann: die erste ist die der expectativen Behandlung, des „laissez aller“ — wenigstens während des ersten acuten Stadiums, welche auf den typischen Ablauf der acuten Gonorrhoe zur Heilung rechnet (vinger). Die zweite geht von vornherein mit Einspritzungen vor; aber mit mild antiphlogistisch und adstringirend, nicht antiseptisch wirkenden Mitteln. Die dritte, welche wesentlich von Chirurgen vertreten wird, will von vornherein die Ursache der Gonorrhoe, die Gonokokken angreifen, also mit antiseptisch wirksamen, zugleich aber die Schleimhaut möglichst schonenden Mitteln arbeiten.

Schon aprioristische Erwägungen ergeben, dass die letzterwähnte Behandlungsmethode diejenige ist, welche bezüglich der Entstehung der Urethritis posterior die geringsten Gefahren darstellt. Denn während bei der expectativen Therapie dem Fortschreiten des Processes, der Vermehrung der Gonokokken kein Hinderniss entgegengesetzt wird, während mit den milden Injektionen der zweiterwähnten Methode die Gonokokken, welche auf der Oberfläche der Schleimhaut wuchern, gradezu nach hinten gespritzt werden können, haben die antiseptischen Injektionen einmal diese letzterwähnte Wirkung nicht; denn alle Bakterien, welche mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, werden getödtet, — einer Propagation des Processes kann also durch sie kein Vorschub geleistet werden. Auf der andern Seite aber bieten sie die einzige uns vorderhand offen stehende Möglichkeit dar, die Ausbreitung der Gonorrhoe zu verhindern — freilich nicht mit Sicherheit; denn wir wissen nicht, wie weit etwa innerhalb des Epithels die Gonokokken nach den tieferen Par-

teen der Harnröhre sich verbreiten; was aber von ihnen in das Lumen der Urethra vorhanden ist, das wird durch diese Injektionen unschädlich gemacht. Einen unmittelbaren thatsächlichen Beweis für die Richtigkeit dieser Anschauung — dass nämlich durch antiseptische Behandlung die Häufigkeit der Urethritis posterior vermindert wird, — giebt die statistische Zusammenstellung Kreckers¹⁾, welcher gefunden hat, dass die Epididymitis bei dieser Behandlungsmethode seltener ist, als bei jeder anderen. Da aber die Epididymitis eine — und zwar die gewöhnlichste — Folgeerscheinung der Urethritis posterior ist, so geht aus dieser Statistik mit Sicherheit hervor, dass auch die Urethritis posterior durch diese Behandlungsmethode seltener wird.

In zweiter Linie wirken bestimmte Eingriffe gradezu auf die Urethritis posterior hervorruhend, so in allererster Linie die Einführung von Instrumenten in die Tiefen der Harnröhre, so lange noch Gonokokken vorhanden sind. Darum ist es so falsch, eine länger dauernde Gonorrhoe mit den von Ultzmann angegebenen Instrumenten zu behandeln, ohne vorher festgestellt zu haben, ob eine Urethritis posterior wirklich vorhanden ist — denn ist dies nicht der Fall, so kann sie grade durch den therapeutischen Eingriff hervorgerufen werden.

In dritter Linie begünstigen zweifellos Fehler im Verhalten der Patienten das Zustandekommen der Urethritis posterior: forcierte Bewegungen, Reiten, Tanzen, ferner Excesse in Bacchus et Venere haben in dieser Beziehung eine Bedeutung, deren mechanischen Causalnexus wir zwar nicht kennen, welche aber nach den Erfahrungen der Praxis kaum geleugnet werden können.

Endlich ist noch hervorzuheben, dass Individuen, welche bereits einmal eine Urethritis posterior durchgemacht haben, zweifellos mehr disponirt sind, bei einer erneuten Infektion wiederum relativ schnell an einer solchen zu erkranken. Auf hierfür fehlt uns eine ausreichende Erklärung — aber wir wissen ja, dass die Gonorrhoe überhaupt im Gegensatz zu vielen anderen Infektionskrankheiten nicht bloß keine Immunität, sondern im Gegentheil eine erhöhte Disposition zu neuer Erkrankung zurückläßt.

Ob die von Thedenat und Otis angenommene Praedisposition zu einer Urethritis posterior bei solchen Patienten, die

¹⁾ Zur Aetiologie und Therapie der Epididymitis. Breslau 1886.

anges orificium externum urethrae haben, wirklich besteht, vermögen wir nicht zu sagen. Die Erklärung, welche die genannten Autoren für diese Thatsache geben — dass nämlich durch das lange Orificium eine gewisse Stauung, gleichsam ein Regurgitiren des Harnstrahls zu stande kommen solle, erscheint uns nicht besonders plausibel.

Ueber die pathologische Anatomie der eigentlichen chronischen Gonorrhoe und speciell der Urethritis posterior, wissen wir noch so gut wie gar nichts. Die endoskopischen Bilder, aus welchen Désormeaux und in neuester Zeit Oberländer anatomische Beschreibungen abzuleiten versuchten, sind nicht eindeutig und klar genug, um histologische Untersuchungen ersetzen zu können. Solche aber sind überhaupt noch nicht vorgenommen worden — die wenigen mikroskopischen Beschreibungen, welche von zufällig bei Sektionen gewonnenen Präparaten herrühren, beziehen sich alle auf recht vorgeschrittene Stadien, bei welchen zum Theil schon Strikturbildung bestand. Desruelles¹⁾ berichtet von einem an Pleuritis Gestorbenen, welcher 20 Jahre an Urethritis gelitten hatte. Er fand hauptsächlich die pars membranacea mit zahlreichen gelblichweissen Granulationen ausgefüllt, die ganze Urethraschleimhaut war blass zart und dünn. Vor ihm berichtet Civiale (1850) von einem Strikturkranken, welchen Leroy secirte: Es fanden sich hinter der Striktur in der pars prostatica zahlreiche feine, schmutzig graue Granulationen.

Cullerier²⁾ sah zufällig bei Sektionen einen 33 Tage ante mortem acquirirten Tripper und eine 2 Monate alte Urethritis: dunkelviolette Röthe der ganzen pars anterior, verdickte und rauhe Schleimhaut. Auf der unteren Wand der pars prostatica fand er gegen 20 rothe Körnchen, ähnlich den Granulationen der Konjunktiva. Fauconnier³⁾ (1877) sah eine 7 Jahr alte Urethritis gonorrhoeica; am Blasenhalss war die Schleimhaut narbenartig weiss, ohne Vaskularisation, das caput gallinaginis vergrößert und verdickt; die pars membranacea blass und glatt, ebenfalls wie Narbengewebe, doch fand sich hier längsziehende

1) Hist. de la blennorrhée urethrale. Paris 1854.

2) Précis iconographiques des malad. veneriennes. Paris 1866.

3) These. Paris 1877.

Vaskularisation. Die pars bulbosa ist matt, uneben, theilweise erodirt, vaskularisirt, von äusserst feinen dichtgedrängten matt weissen Granulationen besät. Die pars cavernosa ist bis auf die vordersten 5 cm normal, letztere sind stark injicirt. Die mikroskopische Untersuchung der Granulationen ergab kleinzellige Infiltration. Verengerungen oder fibröse Verdickungen fanden sich nicht. Vajda¹⁾ (1882) constatirte (2 Fälle, einer mit Striktur und Periurethritis):

1) Vier- bis zwölffache Verdickung des Epithels mit gleichzeitiger Abplattung, so dass das Cylinderepithel der Urethra allmählich schwindet.

2) Die neugebildeten Epithelmassen sammeln sich mit Vorliebe an der Spitze neugebildeter hypertrophischer Papillen, wodurch kolbige drüsige Exkrescenzen, schliesslich Papillome entstehen.

3) Die Papillome und Epithelverdickungen nehmen nach der Tiefe hin zu.

4) Das Bindegewebe wird infiltrirt.

Ein Fall von chronischer Urethritis, wobei nur der Bulbus ergriffen war, findet sich in dem Atlas von Guyon und Bazy: Die Schleimhaut erscheint blutreich und exkoriirt; in einem zweiten daselbst abgebildeten Falle finden sich Granulationen und Geschwürchen, welche nach vorn hin allmählich abnehmen.

Gueillot fand einen violettfarbigen bulbus von dendritischen, nach vorn abnehmenden Gefässen durchzogen.

Strikturen untersuchte histologisch Neelsen²⁾ und in der neuesten Zeit Posner³⁾; sie fanden eine Verwandlung des normalen Cylinderepithels in verhornendes Pflasterepithel in der urethra anterior; in der urethra posterior ist schon normalerweise Pflasterepithel vorhanden, hier werden sich also vermuthlich noch leichter solche Verhornungen ausbilden können. Wie aber der chronisch-gonorrhoeische Process selbst, wie vor Allem der nicht mehr spezifische Katarrh der urethra posterior sich histologisch darstellt, das können wir höchstens aus Analogieen schliessen.

¹⁾ Seltene Befunde bei chron. Blenn. der männl. Harnröhre. Wien. med. W. 1882.

²⁾ V. f. Derm. 1887.

³⁾ Virchows Archiv. 1889 Bd. 118.

Eine ausführlichere Darstellung müssen wir noch der Diagnose der Urethritis posterior widmen: das Auftreten der ihr eigenthümlichen subjektiven Symptome genügt oft, die Diagnose zu stellen, und zwar ist das ganz besonders bei den erst entstehenden Fällen möglich, bei welchen der plötzlich sich einstellende Harndrang auf die Urethritis posterior hindeutet. Wenn über die Entzündung, wie das in einer sehr grossen Zahl von Fällen geschieht, allmählich nach dem hinteren Abschnitte der Harnröhre vordringt, so können solche stürmische Erscheinungen mehr oder weniger vollständig fehlen und man kann, wenn man die objektive Untersuchung unterlässt, die Urethritis posterior vollständig übersehen. Aber auch wenn Harndrang und die anderen Symptome der akuten Urethritis posterior vorhanden waren, verschwinden sie doch meist nach wenigen Tagen und dann ist es oft sehr schwer, sie in der Anamnese aufzudecken. Wir können also hier die objektive Untersuchung fast niemals entbehren. Die Methoden, welche uns für dieselbe zur Verfügung stehen, sind sehr verschieden.

Das Endoskop bietet, wie schon oben erwähnt, geringe Vortheile, welche durch mannigfache Nachtheile übercompensirt werden, so dass von einer Verwendung in der allgemeinen Praxis füglich nicht die Rede sein kann. Abgesehen von den schon hervorgehobenen, nicht leicht zu umgehenden Schwierigkeiten der Ausführung ist noch zu betonen, wie nahe die Gefahr einer Uebertragung der Entzündung aus der erkrankten pars anterior auf die posterior, deren Zustand doch erst erforscht werden soll, mit Hülfe des Endoskops liegt. Casper, welcher meint, dass mit diesem Instrument die Entscheidung wohl sicher gelinge, fügt hinzu, dass auch die schonendste Einführung des Endoskops, namentlich bei mehr diffusen Gonorrhoeen, eine seine Anwendung kontraindicirende Reizung veranlasse.

Dieselbe Gefahr birgt auch, ohne die gleichen Vortheile zu bieten, die Untersuchung der Harnröhre mit einfacher oder geknöpfter Sonde; — man soll mehrere Male (!) untersuchen und sehen, ob dieselben Schmerzpunkte angegeben werden — es kommt dazu, dass die subjektiven Empfindungen der einzelnen Individuen bei dem Bougiren doch von ausserordentlich verschiedener Intensität sind, so dass in einer grossen Zahl von Fällen

ein Schluss aus derart gewonnenen Angaben doch ein höchst gewagter sein dürfte.

Die oben ausführlicher dargelegte Thatsache, dass der compressor urethrae Flüssigkeiten, welche sich im hinteren Abschnitt der Urethra befinden, einen grösseren Widerstand entgegensetzt, als der Blasenschluss, hat eine andere Methode geschaffen, um eine isolirte Erkrankung des hinteren Abschnittes zu erkennen: die mehrfach erwähnte, sogenannte Zwei Gläser Probe. Werden nämlich in dem hinter dem sphincter externus gelegenen Theile der Urethra grössere Mengen von Eiter produziert, so fliessen diese nach dem Orte des geringeren Widerstandes, in diesem Falle in die Blase, ab, mengen sich dem Blaseninhalt bei und sind in diesem durch Trübung desselben kenntlich; jede Blasenentleerung wird also getrübbten Harn aufweisen, während bei einer Sekretion des vorderen Abschnittes nur die erste Portion des gelassenen Harns sich trüben wird. Der kräftige Tonus, in welchem sich die Wände der pars membranacea und prostatica befinden, wird im Stande sein, auch kleine Mengen hier secernirten Eiters in die Blase zu befördern. Doch ist ein Erforderniss zu berücksichtigen, auf welches schon von Casper aufmerksam gemacht wurde, dass nämlich das Sekret nicht spärlich und gleichzeitig dickflüssig ist, was bei einer grossen Anzahl von Fällen von Urethritis posterior und vor allem bei fast allen längere Zeit bestehenden stattfindet. In diesem Falle ist ein Einfliessen des Sekrets in die Blase unmöglich, und die Zweigläserprobe giebt kein Resultat; denn schon durch den ersten Urinstrahl werden die Entzündungsprodukte in Form von Fäden aus der urethra anterior und posterior zu gleicher Zeit fortgespült. Unter einer Bedingung freilich können auch festere Entzündungsprodukte in der zweiten Urinportion als Fäden erscheinen; das ist, wenn die Entzündung auf die Drüsenausführungsgänge der pars prostatica übergreifen hat, in ihnen sich Schleim und Eitermassen ansammeln und diese — gleich Propfen — herausgepresst werden, wenn sich am Schluss des Urinlassens die pars posterior urethrae wieder kontrahirt. Auf diese Weise entstehen nach der Erklärung Fürbringers jene kleinen kommaähnlichen Urinfäden, welche bei chronischen Fällen sich auch in der zweiten Urinportion finden.

Wenn freilich die Darstellung Fingers sich als richtig erweisen

ellte, dann müsste unter bestimmten Verhältnissen immer ein Uebergang des von der urethra posterior gelieferten Sekrets in den in der Blase stagnirenden Urin stattfinden. Finger meint nämlich, dass mit zunehmender Füllung der Blase der hinterste Theil der Urethra sich trichterförmig ausdehne. Er konnte durch Einführen eines Katheters in eine das eine Mal stark gefüllte, das andere Mal fast leere Blase konstatiren, dass die Harnröhre im ersteren Falle eine 2—3 cm betragende Verkürzung erfährt, also zum Theil in die ausgedehnte Harnblase mit eingezogen wird; wäre dies der Fall, dann müssten in der That auch festere Entzündungsprodukte, soweit sie in dem erweiterten Theile der pars posterior liegen, bei längerer Urinretention in die Blase gleichsam aufgewirbelt werden, also in der zweiten Urinportion erscheinen. (adassohn¹⁾) aber, welcher an einer Reihe von Patienten das Experiment Fingers wiederholte, kam nicht zu demselben Resultate; in der Mehrzahl der Fälle blieben sich die Katheterlängen unter den entgegengesetzten Füllungsverhältnissen gleich; in einer Anzahl war das Resultat sogar scheinbar umgekehrt. Er gelangte dadurch zu dem Schluss, dass für die Praxis diese Einziehung der Harnröhre in die Blase keinen Werth haben könne; dass man vielmehr in den Fällen, in denen ein spärliches, dickflüssiges Sekret, welches, wenn die Annahme von der Trichterbildung zutrifft, wohl in den Blaseninhalt aufgenommen worden sein könnte, vorhanden ist, um sicher zu gehen und praktisch verwertbare Resultate zu haben, einen anderen Weg einschlagen müsse. Schon Casper, Finger und Goldenberg schlugen die Ausspülung der urethra anterior und sorgfältige Besichtigung des nachher gelassenen Harns vor, um durch Ausschliessung aller von der urethra anterior gelieferten Entzündungsprodukte die der urethra posterior — höchstens mit denen der Blase gemischt — zu erhalten.

Die Franzosen wenden zur Reinigung der pars anterior ein geknüpft mit Watte umwickeltes Bougie an, mit welchem sie den daselbst sitzenden Schleim und Eiter solange herauswischen, bis das Wattebäuschchen sich frei davon zeigt. Leroy d'Etiolles armirte das Bougie mit einem kachirten Schwämmchen, welches am bulbus angelangt bloss gelegt und herausgezogen

¹⁾ Verh. d. deutsch. dermat. Gesellschaft. Wien 1889.

wurde, und führte dann ein gewöhnliches Bougie in die pars posterior, um sich von dem Vorhandensein von Schleim und Eiter zu überzeugen.

Zeissl injicirt einfach mit einer Spritze reines Wasser in die pars anterior.

Um nun zu constatiren in einer wie grossen Anzahl von Fällen man durch die — ja viel bequemere — Zweigläserprobe allein zum Ziel kommt, wie oft man aber der Ausspülung bedarf, um eine Urethritis posterior aufzudecken, ist die Ausspülungsmethode von Jadassohn in folgender Weise praktisch in einer Anzahl von Fällen geübt worden. Er spült mit einem elastischen, an einem mittelhoch hängenden Irrigator befestigten Katheter (8 bis 12 Charrière) die gesammte Urethra anterior aus, indem er den Katheter langsam und vorsichtig bis zum m. compressor führt und zugleich immer wieder das orificium externum urethrae komprimirt, damit die einlaufende Flüssigkeit (am besten leicht erwärmte dreiprocentige Borsäurelösung) die Urethralwände ausdehnt und so die Entzündungsprodukte aus allen ihren Falten entfernt. Die Vollständigkeit der Ausspülung wird durch eine Besichtigung des leicht aufzufangenden Spülwassers kontrollirt. Der Patient sitzt auf der Kante eines Stuhles; zwischen seinen Beinen steht ein Eimer, über demselben ist eine Wachstuchdecke gebreitet, auf welcher, wie auf einer Rinne das Spülwasser in den Eimer abfliesst, zweckmässig ist am oberen Rand der Decke ein Loch angebracht, durch welches der Penis gesteckt wird. Die ganze Procedur, welche wenige Minuten erfordert, bietet vor dem einfachen Ausspritzen der Urethra doch eine bei weitem grössere Sicherheit. Nach einer Harnretention von einigen Stunden — es ist nicht nöthig, dass die Blase ganz gefüllt ist — bietet dieses Verfahren in jedem einzelnen Falle den sicheren Nachweis, ob eine Urethritis posterior vorhanden ist. Jadassohn prüft nun dieses Verfahren in einer grossen Anzahl von Gonorrhoeen Fällen, in welchen die Infektion mindestens über vier, in den grossen Mehrzahl aber über sechs Wochen zurücklag, Fälle, welche die verschiedensten Stadien, von reichlicher profuser eitriger Sekretion bis zum klinisch unscheinbaren, seit Jahren unverändert bestehenden Urethalkatarrh, aufwiesen. Er konnte mit Hilfe dieser Methode 30,7 Procent Urethritis posterior feststellen, bei welchen die Zweigläserprobe ein

esultat nicht ergeben hatte. Dazu kam noch, dass in 2,1 Procent die Zweigläserprobe nicht stets, sondern nur zeitweise ein positives Resultat ergab, dass ferner in 24,5 Procent nur zeitweise, oft nur einmal in der zweiten Portion Fäden gefunden wurden, so dass man wohl berechtigt ist zu der Behauptung, dass bei der Stellung der Diagnose auf Urethritis posterior eine andre Methode dieser der Ausspülung an Sicherheit gleichkommt. Ganz besonders wichtig ist dies für die allgemein praktische Verwerthung, wo es sich darum handelt nach einmaliger Untersuchung die Therapie sofort in die richtige Bahn zu lenken, um eine Verschleppung der Krankheit ins Unendliche vorzubeugen.

Eine zweite wichtige Aufgabe neben der Erkennung des locus morbi erfüllt die Methode der Ausspülung mit genügender Sicherheit, nämlich die Beantwortung der Frage zu gewährleisten, ob die Urethritis eine gonorrhoeische ist, oder ob sich Gonokokken nicht mehr vorfinden.

Eine besondere Berücksichtigung erfordern diejenigen Fälle, bei welchen in dem vorderen Theile der Urethra keine Gonokokken gefunden werden, während die Urethra posterior solche enthält. Jadassohn hat die Entzündungsprodukte der pars anterior und der posterior gesondert untersucht und ist zu dem Resultat gekommen, dass namentlich bei länger bestehenden, durch Einspritzungen viel behandelten Fällen in der nach der Ausspülung reines Posterior-Sekret enthaltenden Flüssigkeit Gonokokken leicht nachweisbar waren, während sie in dem aus der pars anterior gewonnenen Sekret, respektive aus dem Gesamturin oft nicht oder nur sehr schwer zu finden waren. Ist nun wegen Dickflüssigkeit oder spärlicher Menge des Sekrets der pars posterior ein Regurgitiren nicht möglich, so mischen sich in der ersten Urinportion die Sekrete der pars anterior und der posterior als gleich aussehende Fäden durcheinander; es kann aber auch zu der Zeit, da der virulente Katarrh der pars posterior noch reichliche Entzündungserreger enthält, die urethra anterior durch desinficirende Einspritzungen (wenn auch nur vorübergehend) frei von solchen geworden sein; bei der grossen Anzahl der Fäden aus der ganzen Urethra würde es nun lediglich dem Zufall anheimgestellt, ob man grade einen gonokokkenhaltigen Faden aus der pars posterior findet. Dieser ungünstigen Even-

tualität begegnet man, indem man nach Ausspülung der *pan* anterior das Sekret der *posterior* gesondert untersucht; man hat dann die Fäden etc. eines relativ kleinen abgeschlossenen Gebietes und ist nicht mehr dem Zufall ausgesetzt.

Ich könnte eine ganze Anzahl von Krankengeschichten anführen, in welchen die einmalige oder selbst die wiederholte Untersuchung des — meist geringen — Sekrets der *Urethra* anterior oder der aus anterior und posterior stammenden Fäden Gonokokken nicht auffinden liess, diese dagegen gefunden wurden sobald die aus der *urethra posterior* isolirt aufgefangenen Fäden einmal untersucht wurden. Da man nun eine nicht gonorrhoeische *Urethritis* nur diagnosticiren darf, wenn man wiederholt keine Gonokokken gefunden hat, so bringt diese Methode — indem sie häufig gleich bei der ersten Untersuchung ein positives Resultat ermöglicht — Arzt und Patient schnell über eine Periode der Ungewissheit und damit auch des wenig energischen Vorgehens hinweg. Hinweisen muss ich bei der Diagnose der *Urethritis posterior* noch auf einen differentialdiagnostisch wichtigen Punkt: auf die Unterschiede, welche die akute *Urethritis posterior* oder die chronische mit diffuser Harntrübung gegenüber der *Cystitis* aufweist. Ich meine hier natürlich nicht diejenigen Formen, bei denen bereits ammoniakalische Harngährung eingetreten ist, und bei denen diese allein schon den Beweis liefert, dass die Blasenschleimhaut erkrankt ist. Die leichten Formen von *Cystitis* dagegen mit saurer Harnreaktion sind — das muss von vornherein zugegeben werden — sehr schwer von der *Urethritis posterior* zu unterscheiden.

Finger hebt hervor, dass bei der *Cystitis* immer beide Urinportionen getrübt sind, und zwar die zweite mehr als die erste. Das ist ohne weiteres zuzugeben, es sei denn, dass in der *urethra* anterior noch ein so starker Exsudationsprocess vorhanden ist, dass sehr reichliche Sekretmassen dem Urin beigemischt werden. Zweitens aber meint Finger, dass bei der *Urethritis posterior* die zweite Urinportion am Tage häufig klar, am Morgen trüb ist, weil die Regurgitation des Sekrets erst bei langer Urinretention stattfindet, wenn die „Trichterbildung“ bereits begonnen hat. *a priori* können wir diese Voraussetzung nicht gutheissen, — denn zum Ueberströmen flüssigen Sekrets (und um dieses handelt es sich doch hier) ist die Trichterbildung gänzlich überflüssig — es

let nach unseren früheren Auseinandersetzungen auch unter den hier angegebenen Verhältnissen statt — wir würden die von Finger beobachtete Thatsache lieber damit erklären wollen, dass überhaupt zu wenig Sekret zum Ueberströmen in der Pause zwischen zwei Urinentleerungen am Tage geliefert wird, und dass diese geringe Menge als dünner Ueberzug der Schleimhaut in dem kapillaren Raum liegen bleibt.

Die Beobachtung selbst hat in der Breslauer Klinik bisher nur unvollkommen bestätigt werden können, und auch das Experiment, welches Finger zu ihrer Erhärtung angestellt hat, ist bei einigen Versuchen Jadassohns nicht nach Wunsch ausgefallen. Finger konnte durch Einlegen eines Katheters in die entleerte Blase bei Urethritis posterior acuta aus der Blase den Harn in die secernirten Urin entleeren — Jadassohn ist das einige mal nicht gelungen — und er schliesst daraus, dass, worauf schon Ultzmann hingedeutet hat, bei akuter Urethritis posterior sehr häufig eine leichte Blasenreizung vorhanden ist, vielleicht geradezu in Folge der chemischen Reizung durch das in die Blase übergeströmte Sekret.

Diese Combination macht natürlich die Differentialdiagnose zwischen leichtem Blasenkatarrh und Urethritis posterior noch schwieriger, aber — vor Allem, da für die Therapie dieselben Indikationen vorhanden sind — auch weniger nothwendig.

Ein weiteres interessantes Resultat ergab sich nach Anwendung der Ausspülungsmethode, nämlich die hohe Summe von 77 Procent Fällen von Erkrankung der urethra posterior, eine Differenz, welche die früheren Angaben bei weitem übersteigt. Finger giebt den bei weitem überwiegenden Procentsatz für die pars bulbosa an und sagt: „Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Urethritis chronica des Bulbus die häufigste Form ist; aber auch die Urethritis prostatica ist nicht selten.“ (Er führt noch Guyon an, mit 74maligem Ergriffensein der pars bulbosa, 9maligem der pars prostatica unter 103 Fällen.)

Der Verlauf der chronischen Gonorrhoe im allgemeinen, wie der Urethritis posterior im besonderen ist ebenso wie ihre Prognose wesentlich von der Therapie abhängig.

Der Ausgang der akuten Urethritis posterior kann entweder sein, dass der Entzündungsprocess relativ schnell abläuft,

und eine vollständige restitutio ad integrum eintritt, — oder geht in einen sehr verschieden lange Zeit dauernden chronischen Zustand über, in welchem wieder das eigentlich specifische und das rein katarrhalische Stadium zu unterscheiden sind. Endlich können sich in der urethra posterior, wie in der anterior im Anschluss an den gonorrhoeischen Process jene Infiltrationsprocess ausbilden, die schliesslich zur Strikturbildung führen.

Ueber die Genese der Strikturbildung wissen wir noch sehr wenig; dass dieselbe in der urethra posterior verhältnissmässig häufig zu Stande kommt, lehren die statistischen Erhebungen.

Ob aber der gonorrhoeische Process als solcher zur Strikturbildung führt, oder ob gewisse Complicationen, wie zum Beispiel periurethrale Infiltrate und Abscesse, Verletzungen durch Instrumente, einen mehr oder weniger grossen Procentsatz der Strikturen bedingen, darüber fehlen uns noch alle Erfahrungen. Jedenfalls muss hervorgehoben werden, dass gegenüber der ungeheuren grossen Zahl von Gonorrhoeen — akuten sowohl wie chronischen — das Vorkommen von wirklichen Harnröhrenverengungen wenigstens nach dem Material der Breslauer dermatologischen Klinik, immerhin zu den Seltenheiten gehört. Und selbst die sogenannten „weiten Strikturen“, auf welche besonders Otis die Aufmerksamkeit gelenkt hat, sind nach den Untersuchungen Fingers keineswegs so häufig, wie Otis geglaubt hatte. Während ich es mir versagen muss, auf die Pathologie der Striktur hier näher einzugehen, muss ich die Prognose und Bedeutung der chronischen Gonorrhoe mit besonderer Berücksichtigung der Urethritis posterior noch in aller Kürze erörtern. Von wesentlichem Belang für eine solche Erörterung ist naturgemäss der therapeutische Standpunkt, welchen man einnimmt.

Im Allgemeinen ist es ja zur Genüge bekannt, welche Remedien der chronische Tripper zu allen Zeiten dargestellt hat. Wir müssen auch hier wieder streng auseinander halten die eigentlich gonorrhoeischen und die nicht specifischen Formen. Das erste Postulat für die ersterwähnten ist naturgemäss die Beseitigung der Gonokokken. Sie gelingt bei genügender Ausdauer und Sorgfalt wohl immer; freilich gehört dazu eine grosse Geduld von Seiten des Patienten und des Arztes.

1) Stricture of the male urethra. London 1878.

Aber es muss doch hervorgehoben werden, dass gerade für die Beseitigung des ansteckenden Agens der Gonorrhoe die Lehre von der Urethritis posterior die allergrösste Bedeutung besitzt. So lange man, ohne auf das Vorhandensein einer Urethritis posterior zu achten, nur Einspritzungen in die pars anterior macht, so lange behandelt man in einer, wie wir gesehen haben, recht kleinen Anzahl von Fällen nur einen Theil des erkrankten Organs und lässt hinter der — noch so günstig beeinflussten — behandelten Partie einen Infektionsherd zurück, welcher bei jeder Unterbrechung der Therapie, bei jeder Schädlichkeit, welche zur Einwirkung gelangt, zu einer neuen Exacerbation, zu einer Reinfektion gleichsam des ganzen Organs Anlass geben kann. Bei dieser Behandlung hat der Process Zeit, sich recht festzusetzen und chronisch zu werden. Behandelt man aber von dem Augenblick an, wo auch die hintere Harnröhre erkrankt ist, diese ebenfalls antiseptisch, so wird man eher zu dem Ziele gelangen, dem Process definitiv ein Ende zu machen; — dann aber wird nach das nicht specifische Nachstadium naturgemäss kürzere Zeit anhalten, und man wird im Allgemeinen weniger Fälle finden, in denen das letztere die ihm nur allzuoft eigenthümliche ausserordentliche Hartnäckigkeit bewahrt. Was aber dieses Stadium selbst angeht, so muss zugegeben werden, dass die Prognose quoad restitutionem in der That keineswegs günstig ist. Sehr häufig bleiben die leichten Entzündungs- und katarrhalischen Erscheinungen trotz aller therapeutischen Bestrebungen unbeeinflusst. Die Bedeutung der chronischen Urethritis besteht wesentlich — von der bereits erörterten Möglichkeit der Strikturbildung — in nach drei Richtungen hin liegenden Gefahren:

In erster Linie sei hier die Infektionsgefahr bei den noch specifisch gonorrhoeischen Formen erwähnt; sie ist besonders darum so gross, weil die Urethritis posterior gonorrhoeica im Allgemeinen viel symptomloser ist als die anterior, welche meist mehr oder weniger beträchtliche Mengen von Sekret liefert, und weil sie also selbst bei der grössten Gewissenhaftigkeit des Patienten zu einer Infektion — besonders auch in der Ehe — Veranlassung geben kann. Auf die daraus resultirenden Consequenzen habe ich bereits oben hingewiesen. Zweitens bleibt, so lange die Urethritis posterior besteht, auch noch die Möglichkeit, dass Komplikationen eintreten — wirklich gefährliche Zustände resultiren

freilich daraus nur in seltenen Fällen, wenn auch einige an Urethritis sich anschliessende Pyaemieen mit tödtlichem Ausgange publiziert worden sind. Aber Prostatitis, Periurethritis, Cystitis, Vaginitis, Epididymitis und der gonorrhoeische Gelenkrheumatismus sind nicht bloss sehr peinliche, sondern eventuell in ihren Complicationen sehr bedenkliche Erkrankungen. In wie weit diese auch entstehen können, wenn die Gonokokken bereits definitiv verschwunden sind, darüber ist uns bestimmtes nicht bekannt von einigen aber, z. B. von der Periurethritis, der Prostatitis, Cystitis ist es zweifellos, dass sie auch durch eine Infektion mit pyogenen Mikroorganismen entstehen können; für diese bildet dann die chronisch entzündete Schleimhaut auch ohne Gonokokken die Infektionsquelle.


Als letztes Moment, welches die Prognose der Urethritis chronica gonorrhoeica trübt, muss ich dann noch die ganze Fülle nervösen Erscheinungen anführen, auf welche ich bereits am Eingang meiner Arbeit hingewiesen habe. Auf der einen Seite bildet das Bewusstsein, dass die Harnröhre und damit der ganze Sexualapparat noch nicht zur Norm zurückgekehrt ist, die Basis für eine ganze Unzahl neurasthenischer und hypochondrischer Erscheinungen, die sich zunächst wohl meist an die Genitalorgane halten, bald aber den ganzen Menschen in ihren Machtkreise ziehen: von der psychischen Impotenz bis zur schwersten cerebralen und spinalen Neurasthenie mit allen ihren Plagen, von der unausgesetzten krankhaften Selbstbeobachtung bis zur hypochondrischen Psychose. Auf der anderen Seite aber spielen auch auf rein somatischem Gebiet die von der (andauernd unter einem gewissen Reiz stehenden) Urethra ausgelösten neurotischen Symptome eine gewisse Rolle: die sogenannte „reizbare Blase“ (Peyron), Hodenneuralgien, ein unerträgliches Brennen und Jucken in der Harnröhre, häufige Erektionen, praecipitirte Ejakulationen und vieles andere gehört in dieses Gebiet. Und es braucht hier darauf hingewiesen zu werden, wie vielfach die psychischen und die somatischen Elemente dieser nervösen Leiden in einander übergreifen, sich kombinieren und sich gegenseitig verstärken. Alle diese Erscheinungen kommen der gonorrhoeischen wie der katarrhalischen Urethritis posterior in gleicher Weise zu. Die Therapie gehört also zweifellos zu den wichtigsten und zugleich auch schwierigsten Aufgaben des Arztes. Es ist unmöglich diese

einem knappen Rahmen auch nur einigermaßen vollkommen vorzustellen, zumal da hier, wie bei jedem Leiden, bei dem die therapeutischen Erfolge gering sind, die Anzahl der empfohlenen Mittel und Methoden ungeheuer gross ist, und eine kritische Würdigung derselben einen breiten Raum in Anspruch nehmen würde.

Nur das soll hier hervorgehoben werden, dass für die eigentlich gonorrhöische Urethritis posterior, wie für die Urethritis anterior eine antiseptische Methode — besonders Argentum nitricum in schwachen Lösungen mittels Ausspülung oder Einspritzung durch einen bis in die urethra posterior eingeführten Katheter — im Vordergrund steht. Bei der katarrhalischen Urethritis können gelegentlich sehr verschiedene Mittel zum Ziele führen, aber keines mit der Sicherheit, welche für eine therapeutische Methode zu fordern ist. Es ist jedoch zu betonen, dass es keineswegs richtig ist, die Beseitigung jedes Restes von Katarrh erzwingen zu wollen — in der Mehrzahl der Fälle scheinen diese Entzündungen wirklich schädliche Folgen nicht zu haben — und man versichert sich dessen, wenn alle Heilversuche fehlgeschlagen sind, indem man in grösseren Zwischenräumen das Lumen der Harnröhre auf eine Weite prüft.

Dem Patienten aber, welcher durch eine solche blande, nur doch in den berüchtigten Tripperfäden sich äussernde Entzündung andauernd in Aufregung und Missstimmung sich befindet, wird man, um ihn vor schlimmen Folgen zu behüten, sein Leiden als in höchst unbedeutendes und ungefährliches darstellen müssen. Man wird ihm damit mehr nützen, als wenn man unaufhörlich erfolglose und darum immer mehr deprimirende, also schädigende Heilversuche anstellt.

Am Schluss meiner Arbeit erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich Herrn Professor Dr. Neisser sowie Herrn Dr. Jadasohn, Assistenzarzt der königlich dermatologischen Klinik in Breslau für die Anregung zu derselben und für die liebenswürdige Unterstützung meinen herzlichen Dank sage.



einem künftigen Rahmen auch nur einzuzeichnen vollkommen
 ausstellen kann, da hier, wie bei jedem Leiden, bei dem die
 straphischen Folgen gering sind, die Anzahl der eingelegten
 Mittel und Methoden umso grösser ist, und eine kritische
 Prüfung derselben umso mehr in Anspruch nehmen würde.
 Nur das soll hier hervorgehoben werden, dass für die eigentliche
 therapeutische Uebersicht posterior, vor der die Uebersicht anterior
 die antiseptische Methode — besonders Argentum nitricum in
 kleinen Lösungen mittels Auspurgung oder Einspritzung durch
 ein bis in die urethrale postereure eingetragenen Katheter — im
 Uebermaß steht. Bei der katarhalischen Uebersicht können
 eigentlich sehr verschiedene Mittel zum Ziele führen, aber keines
 der Sicherheit, welche für eine therapeutische Methode zu
 fordern ist. Es ist jedoch zu betonen, dass es keineswegs möglich
 die Beseitigung jedes Restes von Katarth zu erwarten zu wollen
 in der Mehrzahl der Fälle scheitern diese Beziehungen wie
 schädliche Folgen nicht zu haben, und man versichert
 zu haben, wenn alle Heilversuche fehlschlagen sind, indem
 in der ersten Untersuchung das Innere der Harnröhre und
 die Weite prüft.

Die Uebersicht über, welcher durch eine solche Uebersicht mit
 in den bestmöglichen Tripperstadien massende Entzündung
 während in Anfang und Beseitigung sich befindet, wird
 an, man ihn vor schmerzhaften Folgen zu betonen, sein Leiden als
 höchst unbedeutendes und ungeschickliches darstellen müssen.
 es wird ihm damit mehr nützen, als wenn man unendlich
 folgere und dann immer mehr betriebsmäßig, also schädliche
 Uebersicht anstellt.

Am Schluss meiner Arbeit erlaube ich eine angenehme Uebersicht
 dem ich Herrn Professor Dr. Zerkow sowie Herrn Dr. J. J. J.
 für die Assistenten der künftigen hermanthologischen Klinik in
 danken für die Anwesenheit zu betonen und für die Heranbildung
 vorzüglich meinen herzlichen Dank sage.



Lebenslauf.

Verfasser ist geboren den 17. Januar 1861 zu Breslau, Sohn des verstorbenen Buchdruckereibesitzers Robert Nischkowsky daselbst, katholischer Confession, besuchte das kgl. St. Matthias-gymnasium zu Breslau, erhielt 1881 das Reifezeugniss daselbst, studirte an der Universität Breslau Medizin, bestand Juni 1886 das Staatsexamen, Juli desselben Jahres das examen rigorosum.

Während seiner Studien besuchte er die Vorlesungen und Cliniken der Herren Professoren und Docenten:

Berger, Biermer, F. Cohn, H. Cohn, Fischer, Förster, Fritsch, Scheidlen, Haeser, Hasse, Heidenhain, Hirt, Kroner, Löwig, Meyer, Neisser, Partsch, Ponfick, Richter, Röhmnn, Roux, Unverricht, Wiener.

Allen diesen seinen hochverehrten Lehrern spricht er hiermit seine aufrichtigste Dankbarkeit aus.

Thesen.

1. Die Ausspülmethode ist die praktisch werthvollste für die Diagnose der Urethritis posterior.
2. Canalisation ist die beste Prophylaxe gegen Typhus.
3. Die beste Therapie bei operablem Echinokokkus ist die Eröffnung des Echinokokkussackes.